~~n° 11~~ n° 20. n° 21

Rapport d'une observation envoyée a L'academie Royale de Chirurgie par M.r Giffard Chirurgien accoucheur

---

une fille agée de 34 ans de bonne Constitution, apres avoir Eprouvé pendant 10 années Consecutives sur les deux Mamelles autour des areoles des Eruptions dartreuses et periodiques qui apparoissoient tous les printemps, et disparoissoient a L'automne, sentit au Mois de juin 1787. des picottements et des Mouvements Vermiculaires dans les trois quarts inferieurs de la Mamelle droite et principalement pres de L'areole; il n'y avoit ni rougeur ni gonflement. on usa de Cataplasmes emollients d'embrocations avec des graisses, on appliqua du sel Marin Calciné le tout sans effet.

le dix aoust elle s'apercut qu'un petit vers sortoit a Coté du Mamelon, depuis ce jour jusqu'au 18. il en sortit. 17. tous de 4 a 5 Lignes de Long grêles et blancs, de L'espece des ascarides, il en sortit encore beaucoup d'autres jusqu'a la fin de L'automne temps auquel les années antecedentes disparoissoit L'eruption dartreuse; la Malade ne sentit. plus rien

ARC 26 n° 21

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

plus rien jusqu'au Mois de Mars presente année,
qu'elle a eprouvé les picottements, et Mouvements vermiculaires
dans La Meme Mamelle de la quelle il est sorti 4 vers
Cylindriques de pareille forme et grandeur a Celuy que mr.
giffard a envoyé a L'academie lequel est absolument
semblable aux strongyles qui sortent des intestins ;

jay voulu faire tremper le ver dans de L'eau de vie foible
il s'est Gonflé et la Liqueur apres trente heures s'est trouvée
toute Gelatineuse et tenante au Corps du ver.

apres des auteurs dignes de foy tels que Ruisch. Vallisnieri,
paracelse, Baltonius, duret, forestus, Schinkius, th. Bartolin,
dom. de Marchettis, andry et bianchy, qui ont vus de vers
dans le Cerveau, dans la substance Meme des os, paré
qui en a trouvé un dans un abces a la Cuisse, on ne peut
revoquer en doute qu'il puisse s'en engendrer dans les
Mamelles, dont les liqueurs doivent etre plus disposées
que celle des autres parties exterieures a degenerer en
aigre doux qu'on sait etre les plus propres aux
developement des vers de cette espece.

Mais comment les vers ont ils étés deposés dans cette partie ? y ont ils étés portés avec les sucs nutritifs ? ont ils étés deposés sur la peau dans des Lotions ou topiques qui pouvoient les contenir ? ou bien se sont ils spontanement formés par la degenerescence des Liqueurs ? il ne m'apartient de decider un point aussi curieux qu'important. je me restrains a dire que parmy les auteurs que jay parcouru sur ce sujet, les plus recommendables croyent a la preexistence de chaque espece de vers, dont la tenuité des oeuf peut s'insinuer dans toute nos parties avec les sucs nutritifs et que leur developement a lieu en raison des liqueurs qui sont propres a leur nouriture et accroissement.

parmy les nombreuses observations citées par andry et Bianchy qui ont fait de tres importantes rechers sur la formation des vers dans le corps humain, on na vu de vers cilyndriques que dans l'ombilic encore doute l'on qu'ils y ayent pris naissance. cette espece n'est point au nombre des helcophages ou cutanés Mr giffard

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Mr giffard est le premier qui en ait observés sortant des Mamelles, j'estime que L'académie doit garder soigneusement son observation luy en temoigner sa reconnoissance et L'engager a nous faire part de ce qu'il pourra encore observer sur ce sujet.

Mr giffard demande si les antivermineux donnés interieurement, le Mercure appliqué a l'exterieur pourroient être util, d'apres la Maniere dont L'auteur a redigé son observation il est en etat de saisir les indications a remplir et L'academie dispensée de Luy donner des avis.

a paris le 10 juillet 1788

Mauyrayb

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N